

يتعين على المراهقين

فحص مناعتهم المكتسبة عن طريق التطعيم

المراهقون الذين فاتتهم التطعيمات ضد الحصبة والنكاف والحميراء (الحصبة الألمانية) يتعين عليهم الخضوع للتطعيم في أسرع وقت ممكن. إن إلقاء نظرة على شهادة التطعيم يعطي معلومات حول التطعيمات التي تم الحصول عليها. ويمكن الاستفادة من الزيارة القادمة للطبيب أو من فحص صحة الشباب الـ1 في سد الفجوات التطعيمية.



هل هناك خطة لعملية تبادل تلاميذ/طلاب؟

لمنع تفشي الحصبة في المدارس والجامعات، تطلب بعض الدول من التلاميذ والطلاب التطعيم ضد الحصبة.

متى ينصح بالتطعيم للبالغين؟

نظراً لإصابة البالغين الصغار السن أيضاً بالأمراض بصورة متزايدة، توصي لجنة التطعيم الدائمة STIKO منذ عام ٢٠١٠ بالتطعيم لمرة واحدة ضد الحصبة لجميع المواليد بعد عام ١٩٧٠ الذين لم يتم تطعيمهم نهائياً أثناء طفولتهم أو تم تطعيمهم لمرة واحدة فقط. ويُفضل أن يتم التطعيم باستخدام لقاح الحصبة والنكاف والحميراء.

يتعين على الآباء والبالغين الصغار السن الذين يعملون في مرافق مجتمعية أو في الخدمات الصحية فحص مناعتهم المكتسبة عن طريق التطعيم، ذلك أن الشخص الذي لديه مناعة ضد الحصبة لا يمكن مثلاً أن يُعدي الرضع الذين لا يزال من غير الممكن تطعيمهم بعد.

تحمل التكاليف

تتحمل مؤسسات التأمين الصحي تكاليف التطعيمات الموصى بها. أما التطعيمات المرتبطة بالمهنة فيتحملها رب العمل في المعتاد.



مخاطر التطعيم أقل من مخاطر المرض

بعد التطعيم يمكن أن يتسبب تحفيز مناعة الجسم الذاتية في حدوث احمرار أو تورم في موضع الوخز، مما قد يسبب ألماً. ويمكن أيضاً الإصابة بشكل مؤقت بحمى بسيطة أو صداع أو متاعب في الجهاز الهضمي.

وبالنسبة للرضع تم ملاحظة الإصابة باختلاجات حُموية في حالات نادرة. وتم الإبلاغ عن حدوث متاعب في المفاصل لدى البالغين الصغار السن. ونظراً لأن الأمر يدور حول لقاح حي، فإنه يمكن على نحو عارض حدوث طفح جلدي بسيط شبيه بالحصبة بعد أسابيع قليلة من التطعيم، إلا أن هذا الطفح الجلدي غير معدي.

الأثار الجانبية الخطيرة مثل تفاعلات الحساسية تحدث بصورة نادرة جداً، وفي حالات فردية قليلة جداً على مستوى العالم تم الإبلاغ عن إمكانية الإصابة بالتهاب دماغي.

بالرغم من إمكانية الإصابة بأثار جانبية، إلا أن مخاطر التطعيم أقل كثيراً من مخاطر الأمراض. فبينما لوحظ مثلاً الإصابة بالتهاب دماغي في أقل من شخص من بين مليون شخص بعد التطعيم بلقاح الحصبة والنكاف والحميراء، تعرض حوالي واحد من كل ألف شخص مصاب بالحصبة للإصابة بالتهاب دماغي.

تفهمه

أنا تزد، رسا رسية ابابريك بهزة واه من وهانق الاتلوزيه. وبتوزين وازر الارسيةات الازها ما وده سارغح ايج رارةاز ريج. هيفي رارة بخوزة الامن اوة اسلفه، اء اماناتق ون هسك پوهان وده سارغح الاتلوزيه انا انا ه الاي. ريجر وننا الاترءق و لهرببنا اء لهرببنا سغح ما ارشأن.

معلومات أخرى

يمكنك الحصول عليها.

- لدى المركز الاتحادي للتوعية الصحية BZgA على الموقع الإلكتروني: www.impfen-info.de
- لدى معهد روبرت كوخ على الموقع الإلكتروني: www.rki.de/impfen
- في نشرة BZgA "التطعيم". رقم الطلب: 11128000
- في كتيب BZgA "أطفالنا". رقم الطلب 11070000
- مجلد الآباء الصادر عن مركز BZgA "أكبر بصحة جيدة" (Gesund groß werden)، رقم الطلب 11130000

يُطلب من وسائط BZgA:

- مركز BZgA، ١٠١١٥ كولونييا
- order@bzga.de
- www.bzga.de/infomaterialien

النائشر

جهة النشر:

المركز الاتحادي للتوعية الصحية BZgA، كولونييا.

جميع الحقوق محفوظة

التصميم: IDEART-Agentur.de، مونستر

صون:

Fotolia , Sobott | w | a

تاريخ الإصدار: ٢/٢٠١٢

هذه النشرة تصدر هذه النشرة مجاناً من المركز الاتحادي للتوعية الصحية BZgA. ولا يجوز للمستلم/المستلمة أو الغير بيعها.

الحصبة والنكاف والحميراء

التطعيم

يحمي الأطفال والمراهقين والبالغين صغار السن

BZgA

Bundeszentrale
für
gesundheitliche
Aufklärung

